Dachverband für
Soziales und Gesundheit
Federazione per il
Sociale e la Sanità

Dienststelle für
Selbsthilfegruppen
Servizio per
Gruppi di auto aiuto

Mögliche Folge einer Schilddrüsenoperation: Hypoparathyreoidismus Austausch unter Betroffenen

Bei Schilddrüsen-Operationen kommt es in seltenen Fällen zur Beeinträchtigung bzw. Mitentfernung der Nebenschilddrüsen. Hypoparathyreoidismus (Nebenschilddrüsen-unterfunktion) entsteht.

Betroffene suchen Betroffene, um gegenseitig Erfahrungen und Informationen über Lebensqualität, Symptome und Therapie des Hypoparathyreoidismus auszutauschen (in dt. und it. Sprache).

Die Folgen u.a.:
- Kribbeln in Armen und Beinen
- unerklärliche Angstgefühle, Atemnot
- Muskelkrämpfe z.B. auch in Händen und Gesicht



Das Problem:
- Es handelt sich um eine seltene Krankheit, weshalb der Umgang damit schwierig ist
- Die bestehenden Behandlungsmöglichkeiten (mit Calcium und Vitamin-D-Präparaten) beheben das Problem manchmal nur unzureichend.



Die Lösung:
- Gründung einer Selbsthilfegruppe
- für besseren Informationsfluss zwischen Fachleuten, Hausärzten und Patienten sorgen
- in Sachen Forschung für verbesserte Therapiemöglichkeiten eintreten



Kontakt:

E-Mail: hypo.ipopara.bz@gmail.com
Dienststelle für Selbsthilfegruppen, Tel. 0471 312424

Infomaterial - Netzwerk Hypopara, Berlin - https://hypopara.de/cms/

Pass für Patientinnen und Patienten mit Hypoparathyreoidismus:
https://hypopara.de/cms/neuer-hypopara-patientinnen-und-patienten-pass/

Ernährung beim Hypoparathyreoidismus:
https://hypopara.de/cms/neue-broschuere-ernaehrung-beim-hypoparathyreoidismus/

Dachverband für Soziales und Gesundheit
Federazione per il Sociale e la Sanità

Dienststelle für Selbsthilfegruppen
Servizio per Gruppi di auto aiuto

Possibile conseguenza di un intervento alla tiroide: Ipoparatiroidismo
Pazienti cercano altri pazienti

La causa più frequente di ipoparatiroidismo é l'asportazione/lesione delle paratiroidi durante un'intervento alla tiroide.

Pazienti cercano altri pazienti per scambiare esperienze ed informazioni sulla qualitá di vita, sui sintomi e sulle terapie dell´ipoparatiroidismo (in ted. e ital.).

Conseguenze:
- Formicolio nelle braccia e gambe (parestesie)
- Ansie immotivate, crisi respiratorie
- Crampi muscolari es. agli arti e in viso



Problemi:
- È una malattia rara e quindi non facile da gestire
- la terapia al momento disponibile (con calcio e preparati di Vitamina D) risulta talvolta insufficiente



Soluzioni:
- creare un gruppo di autoaiuto
- migliorare l´informazione tra esperti, medici e pazienti
- nella ricerca scientifica fare pressione per migliorare la terapia



Contatto:
E-mail: hypo.ipopara.bz@gmail.com
Servizio per Gruppi di auto aiuto, tel. 0471 312424

Materiale informativo - Netzwerk Hypopara, Berlino - https://hypopara.de/cms/
in lingua tedesca

Pass per pazienti con Ipoparatiroidismo:
https://hypopara.de/cms/neuer-hypopara-patientinnen-und-patienten-pass/

Nutrizione con Ipoparatiroidismo:
https://hypopara.de/cms/neue-broschuere-ernaehrung-beim-hypoparathyreoidismus/